

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

от «19» 2014 г.

№

726



Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата

Циннабсин

Торговое наименование

Циннабсин

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Таблетки

Состав

Одна таблетка (250 мг) содержит

Активных веществ: Cinnabaris trit. D3 25.00 мг, Hydrastis trit. D3 25.00 мг,
Kalium bichromicum trit. D3 25.00 мг, Echinacea trit. D1 25.00 мг;

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал,
магния стеарат.

Описание

Таблетки почти белого цвета, плоскоцилиндрической формы с фаской.
Иногда с отдельными темными точками.

Фармакотерапевтическая группа

Назальные препараты. Антикongестанты для системного использования.

Код АТХ R01B

Фармакологические свойства

Комплексный гомеопатический препарат для лечения заболеваний органов дыхания, при различных симптомах острого и хронического риносинусита. Cinnabaris уменьшает характерные симптомы воспаления околоносовых пазух (головная боль, состояние протрации и слезотечение) и лицевой невралгии. Hydrastis и Kalium bichromicum способствуют более быстрому выздоровлению при затянувшихся формах синусита. Все три ингредиента

способствуют снятию отёка слизистых оболочек и восстановлению носового дыхания. Echinacea стимулирует защитные механизмы организма против инфекций.

Показания к применению

- острый и хронический синусит

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Циннабсин применяют следующим образом:
при остром течении заболевания:

- детям от 2 лет до 5 лет назначают по 1 таблетке 3 раза в день, до наступления улучшения. При дальнейшем лечении продолжать принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки до исчезновения симптомов заболевания.

- детям от 6 до 11 лет назначают по 1 таблетке через каждые 2 часа (но не более 6 таблеток в сутки) до улучшения состояния. При дальнейшем лечении продолжать принимать по 1 таблетке 3 раза в сутки.

Детям рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве воды.

Взрослым и детям старше 12 лет назначают по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 1-2 таблетки 3 раза в сутки до исчезновения симптомов заболевания.

При острых состояниях лечение рекомендуется продолжать в течение 10 дней. В случае сохранения острого состояния или ухудшения в течение первых 3 дней применения препарата его следует отменить и проконсультироваться с врачом по поводу дальнейшего лечения.

При хроническом синусите: взрослые и дети получают по 1 таблетке 3 раза в день; лечение рекомендуется продолжать в течение 4-6 недель.

Циннабсин не рекомендуется принимать более 8 недель, не проконсультировавшись с врачом.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

Побочные действия

Очень редко

- аллергические реакции. У пациентов, принимающих лекарственные средства на основе эхинацеи, наблюдаются сыпь и зуд, в редких случаях возможны лицевые отеки, диспноэ, головокружение и артериальная гипотензия.
- усиленное слюноотделение

Противопоказания

- известная гиперчувствительность к хрому, Echinacea, другим сложноцветным или к одному из прочих ингредиентов
- прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкемия, лейкозы)
- аутоиммунные болезни (коллагеноз, рассеянный склероз)
- при иммунодефицитных состояниях (СПИД, ВИЧ-инфекция и другие)

- при угнетенном состоянии иммунитета (после трансплантации органов или костного мозга, химиотерапии)
- при хронических вирусных заболеваниях
- детям до 2 лет
- наследственная непереносимость галактозы, дефицит фермента Lapp-лактазы, мальабсорбция глюкозы-галактозы.

Лекарственные взаимодействия

Не установлены.

Особые указания

Циннабсин пригоден для лечения больных с целиакией. Препарат не следует назначать при известной аллергии к пшенице (заболеванию, отличающемуся от целиакии).

Циннабсин содержит лактозу. При непереносимости каких-либо сахаров, до начала приема Циннабсина необходимо проконсультироваться с врачом.

При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно преходящее усиление существующих симптомов заболевания (первоначальное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При развитии побочных действий следует отменить препарат и проконсультироваться с врачом.

При усиленном слюноотделении рекомендуется снизить дозу Циннабсина или прекратить прием препарата.

Беременность и период лактации

Циннабсин во время беременности и в периоде лактации можно принимать только после предварительной консультации с врачом и только при положительном соотношении между ожидаемым полезным эффектом и возможным риском.

Влияние на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Не влияет

Передозировка

Не выявлена.

Форма выпуска и упаковка

По 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной.

По 5 контурных упаковок вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку из картона.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель и Владелец регистрационного удостоверения

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

Организация-упаковщик

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ, Германия.

Эксклюзивный представитель

Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцария

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «Альпен Фарма» г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 80, кв. 54
Тел./факс + 7 727 2265306
E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com