


**УТВЕРЖДЕНА**

Приказом председателя Комитета  
контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан



» 06 2017 г.

№ 27

**Инструкция по медицинскому применению  
лекарственного средства**

**Тонзилотрен  
Tonsilotren®**

**Торговое название**

Тонзилотрен  
Tonsilotren®

**Международное непатентованное название**

Нет

**Лекарственная форма**

Таблетки

**Состав**

Одна таблетка (250 мг) содержит

*активные вещества:* Atropinum sulfuricum trit. D5 - 12,5 мг, Hepar sulfuris trit. D3 - 10,0 мг, Kalium bichromicum trit. D4 - 50,0 мг, Mercurius bijodatus trit. D8 - 25,0 мг, Silicea trit. D2 - 5,0 мг,

*вспомогательные вещества:* сахароза, лактозы моногидрат, магния стеарат.

**Описание**

Таблетки белого или почти белого цвета, возможны отдельные темно-серые вкрапления, плоскоцилиндрической формы с фаской, без запаха или с легким сернистым запахом

**Фармакотерапевтическая группа**

Препараты для лечения заболеваний горла, прочие препараты.

Код АТХ R02AA 20

**Фармакологические свойства**

**Фармакокинетика**

В связи с содержанием сверхмалых доз активных ингредиентов в препарате, провести фармакокинетические исследования не представляется возможным.

### **Фармакодинамика**

Тонзилотрен это комплексный гомеопатический препарат; в состав Тонзилотрена входит пять компонентов, которые дополняют друг друга для поддержания организма в процессе самовосстановления и для облегчения симптомов, таких как боль, покраснение и затруднения при глотании.

*Atropinum sulfuricum* развивает свой эффект полностью в начальной фазе лихорадки, его применяют при состояниях, характеризующихся наличием яркого покраснения слизистой оболочки горла с присутствием чувства жара в ней, а также при наличии затруднений при глотании с отмечающимся постоянным ухудшением глотания. *Mercurius bijodatus* особенно подходит для уменьшения гипертрофированных носоглоточных миндалин, а также для снижения инфильтрации узлов шеи. *Hepar sulfuris* оказывает положительное влияние при постоянных и рецидивирующих воспалениях, а также при резкой и колющей боли, распространяющейся на область ушей. Постоянные затруднения при глотании и увеличенные миндалины и полипы чувствительны к *Kalium bichromicum*. *Silicea* ускоряет процесс снятия воспаления и уменьшает восприимчивость пациента к инфекциям путем иммуностимулирующего действия. В целом, Тонзилотрен эффективен при лечении всех фаз воспаления от первых жалоб до излечения хронически рецидивирующих процессов.

### **Показания к применению**

- острый, хронический тонзиллит
- после хирургического удаления миндалин (тонзиллэктомии).

### **Способ применения и дозы**

При отсутствии иных указаний Тонзилотрен применяют следующим образом:

*При остром тонзиллите:* дети от 6 до 11 лет - по 1 таблетке через каждые два часа (но не более 6 таблеток в день) в течение первых 1-2 дней до наступления улучшения; потом - по 1 таблетке 3 раза в день.

Взрослые и дети с 12 лет получают по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 таблеток в день) в течение первых 1-2 дней до наступления улучшения; потом - по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Курс лечения рекомендуется не более 10 дней.

В случае отсутствия улучшения после первых 2 дней лечения или появления новых симптомов заболевания (например, лихорадка выше 38°C), пациент обязательно должен проконсультироваться с врачом.

*При хроническом тонзиллите:* дети от 6 до 12 лет получают по 1 таблетке 3 раза в день, а взрослые и дети старше 12 лет – по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Лечение рекомендуется продолжать в течение 6-8 недель.

Таблетки следует принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту.

### **Побочные действия**

- усиленное слюноотделение. В таких случаях рекомендуется снизить дозу или прекратить прием препарата.
- возможны реакции повышенной чувствительности (например, кожная сыпь).

### **Противопоказания**

- гиперчувствительность к активным и вспомогательным компонентам препарата (например, хрому, ртути и пр)
- гиперфункция щитовидной железы (гипертиреоз)
- детский возраст до 6 лет

### **Лекарственные взаимодействия**

Взаимодействие с лекарственными препаратами не выявлено. Прием этого гомеопатического препарата не исключает лечение другими лекарственными препаратами.

В случае приема других препаратов, включая безрецептурные препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

### **Особые указания**

Пациенты с редкими наследственными заболеваниями (непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы или сахарозо-изомальтазная недостаточность) не должны принимать препарат.

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

#### *Беременность и период лактации*

Применение Тонзилотрена во время беременности и кормления грудью возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

#### *Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Тонзилотрен не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

### **Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 20 таблеток помещают в контурную ячейковую упаковку из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 3 контурных ячейковых упаковки вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку из картона.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С.  
Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок хранения**

5 лет

Не применять по истечении срока годности.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель и владелец регистрационного удостоверения**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ  
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия

**Организация-упаковщик**

Др. Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ, Германия

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)**

ТОО «Альпен Фарма» г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 80, кв. 54

Тел./факс + 7 727 2265306

E-mail: [info.kazakhstan@alpenpharma.com](mailto:info.kazakhstan@alpenpharma.com)