

УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета
контроля медицинской и
фармацевтической деятельности
Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

от «18 03 2013 г.

№ 274



Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Киндинорм Н

Торговое название

Киндинорм Н

Международное непатентованное название

Нет

Лекарственная форма

Гранулы

Состав

10 г препарата содержат

активные вещества: Chamomilla dil. D12 25.00 мг
Kalium phosphoricum dil. D6 25.00 мг
Staphisagria dil. D12 25.00 мг
Valeriana dil. D6 25.00 мг,
вспомогательное вещество - сахароза.

Описание

Однородные шаровидной формы беловатые гранулы с матовой поверхностью. Гранулы не должны слипаться друг с другом.

Фармакотерапевтическая группа

Психоаналептики. Психостимуляторы и ноотропы. Психостимуляторы и ноотропы другие.

Код ATX N06BX

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

В связи с содержанием сверхмалых доз активных ингредиентов в препарате, провести фармакокинетические исследования не представляется возможным.

Фармакодинамика

Киндинорм Н – комбинированный гомеопатический препарат, активные ингредиенты которого ослабляют такие симптомы, как возбудимость, беспокойство, раздражительность. Киндинорм Н способствует повышению способности к обучению, улучшению памяти и концентрации внимания, а также устраняет когнитивные и поведенческие расстройства.

Показания к применению

- поведенческие расстройства (прежде всего у детей) с дефицитом внимания и собранности, нервной раздражимостью, беспокойством, трудностями в учебе, нарушениями сна или состояниями общей слабости

Способ применения и дозы

Дети от 1 года до 5 лет: 2 гранулы 1-3 раза в сутки

Дети от 6 до 11 лет: 3 гранулы 1-3 раза в сутки

Взрослые и дети от 12 лет и старше: 5 гранул 1-3 раза в сутки

Уменьшать частоту приема при облегчении симптомов.

Гранулы принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно растворяться во рту. При необходимости гранулы можно растворять в небольшом количестве воды.

Побочные действия

- возможны реакции повышенной чувствительности.

При наличии побочной реакции необходимо предпринять надлежащие действия.

Примечание: При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

- гиперчувствительность к активным и вспомогательным компонентам препарата

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействие с лекарственными препаратами не выявлено. Прием этого гомеопатического препарата не исключает лечение другими лекарственными препаратами.

В случае приема других препаратов, включая безрецептурные препараты, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Примечание: Вредные привычки: алкоголь и курение, а также стимулирующие средства, могут оказывать негативное влияние на действие гомеопатических препаратов.

Особые указания

Не применять Киндинорм Н у детей младше 1 года ввиду отсутствия данных по безопасности и эффективности.

При отсутствии улучшения после 8 недель приема препарата или при ухудшении состояния следует пересмотреть тактику лечения.

Киндинорм Н содержит сахарозу. Пациенты с редкими наследственными заболеваниями (непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы или сахаразо-изомальтазная недостаточность) не должны принимать препарат.

Беременность и период лактации

Как и в случае со всеми лекарственными препаратами, применение Киндинорм Н во время беременности и кормления грудью возможно только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами

Киндинорм Н не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Форма выпуска и упаковка

По 10 г гранул во флаконы из коричневого стекла с пластмассовой крышкой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках, помещают в картонную коробку.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок хранения

5 лет

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ& Ко. КГ

Оттоштрассе 24

76227 Карлсруэ

Германия

Владелец регистрационного удостоверения

Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ& Ко. КГ
Оттоштрассе 24
76227 Карлсруэ
Германия

Эксклюзивный представитель

Альпен Фарма АГ
Берн, Швейцария

**Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан
претензии от потребителей по качеству продукции (товара)**

ТОО «Альпен Фарма»
г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 80, кв. 54
Тел./факс + 7 727 2265306
E-mail: info.kazakhstan@alpenpharma.com