

## УТВЕРЖДЕНА

Приказом председателя Комитета  
контроля медицинской и  
фармацевтической деятельности

Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан

от « 12 » 09 2014 г.

№

586



### Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

#### Солидагорен

#### Торговое название

Солидагорен

#### Международное непатентованное название

Нет

#### Лекарственная форма

Раствор оральный

#### Состав

10 мл (= 9.5 г) препарата содержат

*активные вещества:* «Солекван»\* экстракта жидкого 7.9 мл (экстракта (1: 1.5 – 2.1) золотарника, лапчатки и хвоща (4.2 : 1.4 : 1)) , экстрагент: этанол 50 % (об/об).

*вспомогательные вещества:* вода очищенная, этанол 96%

\* - «Экстракт Солекван» содержит золотарника обыкновенного травы экстракт (1 : 1.5 – 2.1), лапчатки травы и хвоща травы экстракты (4.2 : 1.4 : 1), экстрагент: этанол 50 % (об/об).

#### Описание

Прозрачная коричневая жидкость.

#### Фармакотерапевтическая группа

Препараты для лечения урологических заболеваний. Другие препараты для лечения урологических заболеваний, включая спазмолитики. Другие препараты для лечения урологических заболеваний.

Код АТХ G04BX

#### Фармакологические свойства

##### Фармакокинетика

Нет данных об исследованиях фармакокинетики и биологической доступности.

### **Фармакодинамика**

Солидагорен – комбинированный растительный препарат, содержащий экстракт из трав золотарника обыкновенного, лапчатки гусиной, хвоща полевого. Оказывает противовоспалительное, антибактериальное, спазмолитическое, умеренное мочегонное действие, снимает спазмы и расслабляет мускулатуру мочеточников. При достаточном потреблении жидкости (2 литра) предупреждает отложение песка в почках и образование мочевых камней.

#### *Золотарник обыкновенный*

В надземной части золотарника обыкновенного содержатся флавоноиды, полиацетиленовые соединения, ди- и тритерпеноиды, сапонины, фенолкарбоновые кислоты, которые обладают вяжущим, противовоспалительным, диуретическим и антибактериальным действием. При почечнокаменной болезни золотарник повышает секреторно-экскреторную функцию почек, регулирует водно-солевой обмен и кислотно-щелочное равновесие.

#### *Лапчатка гусиная*

Трава лапчатки гусиной содержит дубильные вещества, горечи, эфирные масла, флавоноиды, аскорбиновую кислоту, хинную кислоту, холин, цинк и другие биологически активные вещества, которые оказывают спазмолитическое, противовоспалительное и обезболивающее действие.

#### *Хвощ полевой*

Трава хвоща полевого содержит соединения кремния (кремниевая кислота), соли калия, щавелевую, яблочную кислоту и дубильные вещества, флавоноиды, представленные гликозидами кверцетина, кемпферола и лютеолина. Перечисленные соединения обладают противовоспалительным, антисептическим, мочегонным действием.

Как мочегонное и противовоспалительное средство хвощ полевой уменьшает боль в области мочевого пузыря, увеличивая выделение мочи, уменьшает количество белка в ней.

Экстракт хвоща полевого увеличивает фильтрацию в почечных клубочках, повышает рН мочи, снижает уровень мочевой кислоты, повышает выведение кальция и неорганического фосфора, предотвращает образование камней.

### **Показания к применению**

- в комплексном лечении воспалительных заболеваний мочевыводящих путей
- профилактика отложения песка в почках и образования мочевых камней, в том числе и после их удаления
- для усиления диуреза

### **Способ применения и дозы**

Взрослым принимать по 20-30 капель препарата со 100-200 мл воды 3 раза в день (30 капель соответствуют 1.4 мл).

Прием препарата должен сопровождаться обильным питьем не менее 2-х литров жидкости.

По поводу длительности терапии препаратом необходимо проконсультироваться с врачом

### **Побочные действия**

*Очень редко*

- реакции повышенной чувствительности и аллергические реакции
- лёгкие желудочно-кишечные расстройства

В случае появления первых признаков аллергической реакции (например, высыпания) приём препарата необходимо остановить.

В случае появления побочных эффектов, которые не указаны в инструкции, необходимо обратиться к врачу.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата
- аллергия на сложноцветные (Asteraceae)
- детский и подростковый возраст до 18 лет
- эпилепсия
- беременность и период лактация
- заболевания печени

### **Лекарственные взаимодействия**

Не установлены.

Возможно нарушение или усиление эффектов других лекарственных препаратов из-за наличия этилового спирта в составе препарата.

### **Особые указания**

Не рекомендуется применение препарата Солидагорен в качестве мочегонного средства для лечения отёков, вызванных сердечной или почечной недостаточностью. Это особенно касается пожилых людей.

При наличии крови в моче, повышенной температуре или симптоматике сохраняющейся на протяжении более 5 дней рекомендуется проконсультироваться с врачом.

При первых признаках реакции повышенной чувствительности (например, высыпания на коже) прием лекарства прекратить.

При проявлении побочных действий следует обратиться к врачу.

*Предупредительные указания*

Препарат содержит этиловый спирт 45 об.%. При соблюдении указаний по дозировке с каждым приемом 30 капель препарата в организм попадает 600 мг алкоголя.

Препарат противопоказан больным алкоголизмом, эпилепсией, больным с органическими заболеваниями мозга, детям, беременным и в период лактации, больным с заболеваниями печени.

*Особенности влияния лекарственного средства на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

При правильном применении препарата не влияет на скорость реакции.

### **Передозировка**

Случаи передозировки не установлены.

*Лечение:* в случае передозировки - симптоматическое.

### **Форма выпуска и упаковка**

По 20, 50 и 100 мл препарата помещают во флакон из темного стекла, снабженный капельницей из полиэтилена низкой плотности и полипропиленовой навинчивающейся крышкой.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в пачку картонную.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

3 года

Период применения после первого вскрытия контейнера - 3 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

### **Производитель**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

### **Владелец регистрационного удостоверения**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3, 77736 Целль ам Хармерсбах, Германия

### **Эксклюзивный представитель**

Альпен Фарма АГ

Берн, Швейцария

Адрес организации, принимающей на территории Республики Казахстан претензии от потребителей по качеству продукции (товара)

ТОО «Альпен Фарма»

г. Алматы, мкр. Жетысу-2, д. 80, кв. 54

Тел./факс + 7 727 2265306 E-mail: [info.kazakhstan@alpenpharma.com](mailto:info.kazakhstan@alpenpharma.com)