

**УТВЕРЖДЕНА**  
Приказом Председателя  
РГУ «Комитет медицинского и  
фармацевтического контроля  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан»  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.  
**№** \_\_\_\_\_

# Инструкция по медицинскому применению гомеопатического лекарственного препарата (Листок-вкладыш)

## Торговое наименование Дентокинд

Международное непатентованное название  
Нет

## Лекарственная форма, дозировка Таблетки

**Фармакотерапевтическая группа**  
Прочие препараты. Другие терапевтические препараты все. Другие лекарственные препараты.  
Код ATX V03AX

## Показания к применению

Болезненные явления при прорезывании зубов, сопровождающиеся оталгией (болью в ушах), болезненной чувствительностью десен, лихорадкой и диареей.

## Перечень сведений, необходимых до начала применения

## Противопоказания

- гиперчувствительность к одному из активных веществ или к любому из вспомогательных веществ

## *Необходимые меры предосторожности при применении*

В препарате содержится лактоза. Пациентам с редкими наследственными проблемами непереносимости галактозы, дефицитом лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать этот лекарственный препарат. При отсутствии улучшения, при отсутствии стабильной положительной динамики лечения или появлении новых симптомов

обратитесь к врачу, так как в таком случае может идти речь о заболевании, требующем врачебной помощи.

Требуется консультация врача, если возникают следующие симптомы:

- если ребенок плохо реагирует на Дентокинд,
- при возникновении дополнительных жалоб.

### ***Взаимодействия с другими лекарственными препаратами***

Не выявлено никаких взаимодействий с другими лекарственными препаратами. Применение данного гомеопатического лекарственного препарата не исключает применение других лекарственных средств. Родителям рекомендуется проконсультироваться с врачом, если их ребенок принимает, недавно принимал или будет принимать какие-либо другие лекарственные средства.

### ***Специальные предупреждения***

Гомеопатическая терапия значительно отличается от традиционной медицины в отношении определения заболевания и применения лекарственных препаратов. Гомеопатические средства стимулируют собственные защитные механизмы организма и тем самым активизируют способность к самовосстановлению. Ответная реакция организма на гомеопатическое средство индивидуальная.

Имеющееся состояние может временно ухудшиться во время приема гомеопатических лекарственных средств (первоначальное гомеопатическое обострение). В таких случаях пациенты должны прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Не следует применять лекарственное средство вместе с едой и напитками.

### ***Применение в педиатрии***

Применяется у детей грудного и дошкольного возраста

### ***Во время беременности или лактации***

Данный лекарственный препарат предназначен для детей.

### ***Особенности влияния препарата на способность управлять***

***транспортным средством или потенциально опасными механизмами***

Не влияет

## **Рекомендации по применению**

### ***Режим дозирования***

***Детям от 0 до 1 года:***

- при острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в день;
- при улучшении состояния по 1 таблетке 3 раза в день.

***Детям от 1 года до 6 лет:***

- при острых симптомах по 2 таблетки через каждый час, но не более 12 таблеток в день;
- при улучшении состояния по 2 таблетки 3 раза в день.

### ***Метод и путь введения***

Пероральный.

### ***Частота применения с указанием времени приема***

Таблетки принимать за полчаса до или через полчаса после еды. Таблетки должны медленно растворяться во рту. При лечении грудных детей таблетки можно растворять в небольшом количестве воды. Максимальная суточная доза для детей до года - 6 таблеток в сутки, через каждый час. Максимальная суточная доза для детей от 1 года до 6 лет - 12 таблеток в сутки, через каждый час.

#### ***Длительность лечения***

2-4 дня на каждое прорезывание зубов. В зависимости от индивидуального случая циклы лечения могут перекрываться или повторяться.

#### ***Меры, которые необходимо принять в случае передозировки***

Случаев передозировок не зарегистрировано.

#### ***Меры, необходимые при пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата***

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

#### ***Указание на наличие риска симптомов отмены***

Никаких вредных последствий ожидать не приходится.

#### ***Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому работнику для разъяснения способа применения лекарственного препарата***

Если Вы заподозрите, что у Вашего ребенка появляются признаки побочного эффекта после приема препарата Дентокинд, информируйте об этом вашего врача или фармацевта.

#### ***Описание нежелательных реакций, которые проявляются при стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом случае***

Не давайте ребенку двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

При возникновении любых побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

***При возникновении нежелательных лекарственных реакций обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому работнику или напрямую в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов***  
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан  
<http://www.ndda.kz>

#### ***Дополнительные сведения***

#### ***Состав лекарственного препарата***

Одна таблетка (100 мг) содержит

<i>активные вещества:</i>	Atropa belladonna trit. D6	15.00 мг
	Matricaria recutita trit.D6	15.00 мг
	Ferrum phosphoricum trit.D6	15.00 мг
	Hepar sulfuris trit.D12	15.00 мг
	Pulsatilla pratensis trit.D6	15.00 мг,

*вспомогательные вещества:* целлюлоза микрокристаллическая, тальк, лактозы моногидрат, магния стеарат.

***Описание внешнего вида, запаха, вкуса***

Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого или почти белого цвета, с фаской.

**Форма выпуска и упаковка**

По 150 таблеток во флаконе коричневого стекла с алюминиевым уплотнительным диском и пластиковой завинчивающейся крышкой. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и русском языках вкладывают в пачку из картона.

**Срок хранения**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности!

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Сведения о производителе**

Др. Густав Кляйн ГмбХ & Ко. КГ

Штайненфельд 3,

77736 Целль ам Хармерсбах,

Германия

Телефон: +49 (0) 7835 63 55 10

Факс: +49 (0) 7835 634 685

E-mail: [info@klein-naturarznei.de](mailto:info@klein-naturarznei.de)

**Держатель регистрационного удостоверения**

Альпен Фарма ГмбХ,

Штайненфельд 3

77736 Целль ам Хармерсбах

Германия

Тел.: +49 (0) 7243 200 49 20

E-mail: [info.germany@alpenpharma.com](mailto:info.germany@alpenpharma.com)

**Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства**

ТОО «Альпен Фарма»

Алматинская обл., Карасайский район, Елтайский сельский округ, с.Кокузек, строение 1044

Тел./факс + 7 727 232 34 73,  
+ 7 727 232 34 74

E-mail: [info.kazakhstan@alpenpharma.com](mailto:info.kazakhstan@alpenpharma.com)

Моб.тел. +7 701 035 70 69 ответственного лица за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства.

E-mail: [pv.kz@alpenpharma.com](mailto:pv.kz@alpenpharma.com)